

Till dig som ska genomgå operation vid förhuds- förträngning

Operationen

Ingreppet görs i lokalbedövning. Stygnen försvinner av sig självt om 10-14 dagar.

Efter operationen

Smärta och svullnad

Det är normalt att du kommer att känna smärtor i operationsområdet. Du kan smörja med vitt Vaseline eller Xylocain-gel lokalt och ta Panodil och eventuellt Ibuprofen. Det är även normalt att det svullnar kraftigt och det kan ta upp till 10 dagar innan svullnaden lägger sig. Det kan även blöda upp till 10 dagar. Försök att hålla penis i högläge genom tajta kalsonger.

Förband och hygien

Förbandet kan sitta kvar 1 dygn. Därefter kan du använda en vanlig dambinda, som skydd för blod och sårvätska. Undvik att duscha första dygnet. Därefter kan rinnande vatten spolas i operationsområdet. Du kan använda öronpinnar för att rengöra under förhuden. Torka torrt med en ren handduk. Vänta 4-6 veckor innan du har samlag.

Medicinering

I regel behövs ingen medicinering.

Återbesök

I regel krävs inget återbesök.

Sjukskrivning

Arbetar du med tunga lyft, rekommenderas sjukskrivning dagen efter operation.

Kontakt med oss

Om tecken på infektion såsom svullnad med feber och varbildning uppstår ska du kontakta oss.

Efter operationen får du med dig vårt akuttelefonnummer där du kan nå oss vid akuta besvär efter hemkomsten.

Har du frågor är du välkommen att ringa Cario Läkargruppens tidbokning för rådgivning alla vardagar kl.8.00- 12.00, tel. 019-21 79 10

