

Information om manlig steriliseringsoperation

Information om din operation

Operationen

Ingreppet görs i lokalbedövning via ett hål i punghuden. Sädledarna fångas upp och delas och man bränner ändarna. Lokalbedövningen sitter i under drygt 45 minuter och du behöver under 5-3 dagar ha tillgång till t ex Alvedon och Ibumetin som smärtlindring. Om du tidigare har genomgått operation i pungen eller ljumskarna vill vi veta om det så att förutsättningarna för operationen klargörs – eventuellt behöver du träffa urologen innan ingreppet. Om du är blödningsbenägen eller äter blodförtunning behöver vi veta det.

Efter operationen

Smärta och svullnad

Vid operationsområdet kan det vara svullet och missfärgat såsom blåmärken. Det kan kännas som att du har slagit i pungen och smärtorna kan sitta i upp till ett par veckor efter operationen. Du kan ta Panodil och eventuellt Ibumetin mot värken. Det är bra att ha tajta kalsonger för att stödja pungen.

Återbesök

Du behöver inte komma tillbaka till oss och du har fått information om vart du ska gå efter 3 månader och lämna spermieprov. Innan du fått besked om att du är steril behöver du använda skydd.

Sjukskrivning

I regel behövs ingen sjukskrivning men vid tyngre kroppsarbete rekommenderas sjukskrivning dagen efter.

Kontakt med oss

Om pungen blir kraftigt svullen eller uppvisar tecken på infektion, dvs rodnad eller svullnad med feber, får du ta kontakt med oss eller akutmottagningen på närmaste sjukhus.

Har du frågor är du välkommen att ringa 019-217940 måndagar mellan kl 8-9.30

Efter operationen får du med dig vårt akuttelefonnummer där du kan nå oss vid akuta besvär efter hemkomsten.

Du kan även ringa Cario Läkargruppens tidsbokning 019-217910 vardagar mellan kl 8-12.

